

Un projecte d'espècies introduïdes a la Mediterrània Balear

COM LES IDENTIFIQUEM?



Forma densa "catife" sobre la base de Posidonia



Branques inferiors llargues acabades amb forma d'arpó



Plomalls sense branques inferiors en forma d'arpó



Té forma de raïm, amb "grans" d'1 mm de diàmetre



Aspecte de plomes fines verdes



Mates cotonoses vermelles rosades o blanquinoses



Gespes vermelloses denses d'1-2 cm d'alçada



Coral groc-marronós incrustant



Cranc pla d'anelles grogues

Oj a las invasoras

Acrothamnion preissii

Alga de filaments curts, d'uns 2,5 cm d'alçada, de color rosat-vermellós.

Colonitza els alguers (rizomes) i altres ambients poc il·luminats.



SUBSTRAT		S'assenta sobre praderia o roca (5 a 70 m)
ORIGEN		Indo-pacífic
VECTORS D'INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ		Probablement per transport marítim (fouling)

Asparagopsis armata

Mates de gran port (fins a 30 cm d'alçada) habitualment rosades, formades per plomalls.

Detectada a Catalunya, però no a Balears.



SUBSTRAT		S'assenta sobre praderia o roca (0 a 25 m)
ORIGEN		Austràlia
VECTORS D'INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ		Probablement aqüicultura i transport marítim

Asparagopsis taxiformis

Mates de gran port (fins a 30 cm d'alçada) rosades-marronoses-vermelloses formades per branques amb forma de plomall.

Més comuna a l'hivern i a la primavera.




SUBSTRAT		S'assenta sobre praderia o roca (0 a 50 m)
ORIGEN		Austràlia
VECTORS D'INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ		Probablement transport marítim

Caulerpa cylindracea

És una alga de color verd clar de constitució petita (fins a 10 cm d'alçada).

Abans coneguda com a C. racemosa.

Molt estesa i agressiva a la Mediterrània.



SUBSTRAT		S'assenta sobre praderia, roca o sorra (0 a 60 m)
ORIGEN		Oest d'Austràlia
VECTORS D'INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ		Probablement aqüicultura i transport marítim

Caulerpa taxifolia

Alga de color verd intens amb tiges aplanades i estirades.

Va ser la primera alga invasora famosa.

A Balears està desapareixent de forma natural.




SUBSTRAT		S'assenta sobre praderia, roca o sorra (0 a 50 m)
ORIGEN		Carib
VECTORS D'INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ		Aqüicultura. Transport marítim: Àncores, aparells de pesca, etc.

Lophocladia lallemandii

Alga vermella filamentosa de fins a 15 cm d'alçada de desenvolupament estiuenc.

Ja té nom comú: "Pelutxín"

Forma extensos recobriments a Balears i al Mediterrani occidental.



SUBSTRAT		S'assenta sobre praderia o roca (0 a 50 m)
ORIGEN		Mar Roig Indo-Pacífic
VECTORS D'INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ		Probablement a través del Canal de Suez

Womersleyella setacea

Alga de filaments molt fins i imbricats de color vermell-rosat-marronós, com feltre.

Recobreix els fons rocosos de fondària posant en perill el coral·ligen.




SUBSTRAT		S'assenta sobre praderia o roca o com a epífita (15 a 60 m)
ORIGEN		Hawaii Indo-Pacífic
VECTORS D'INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ		Desconegut, podria ser transport marítim: fouling, aigües de llast, pesca, etc.

Oculina patagonica

Colònies incrustants calcificades, de tamany variable, des de mil·límetres fins a 1m.

Pòlips aplanats però prominents.



SUBSTRAT		S'assenta sobre roca (0 a 20 m)
ORIGEN		Desconegut, hi ha evidències que assenyalen l'Atlàntic SO
VECTORS D'INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ		Desconegut però es pensa que pot ser per transport marítim

Percnon gibbesi

Cranc mimètic molt pla i amb potes llargues.

Closca quadrada, de superfície llisa i de color marró-verdós.

Ulls i pines de color taronja.



SUBSTRAT		Es refugia en esquerdes de roques (0 a 4-5 m)
ORIGEN		Atlàntic
VECTORS D'INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ		Probablement transport marítim: aigües de llast i xarxes

Si veus cap d'aquestes espècies, informa'n a


www.observadorsdelmar.cat



MÉS INFORMACIÓ A:
www.ojoinvasoras.info
i
www.observadorsdelmar.cat



Patrocina:



Organitza:



Col·laboren:

